

SURVEILLANCE DE LA DENGUE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Point épidémiologique mensuel - BPI/DPP/DS

Données des laboratoires et des Urgences du Centre Hospitalier de Polynésie française - Situation au 31 juillet 2008

Données recueillies par la Direction de la Santé, avec la collaboration de l'Institut Louis Malardé et du Centre Hospitalier de Polynésie française

La situation reste actuellement stable, avec 138 cas positifs recensés par les laboratoires depuis le début de l'année 2008. 11 nouveaux cas ont été rapportés pour le mois de juillet, dont 2 hospitalisés au CHPF chez des 2 enfants de moins de 1 an.

Seul le sérotype 1 continue à être isolé. Cependant, il existe actuellement une circulation d'un sérotype 4 dans la zone Pacifique (épidémies déclarées au Kiribati et cas récents aux Samoa Occidentales et américaines). Pour rappel, la Pf n'a pas connu d'épidémie à DENV 4 depuis les années 80.

Merci donc de rester vigilants et de demander un examen biologique de confirmation (si possible avant J6 de la maladie) pour toute personne suspecte de dengue qui a voyagé hors de Polynésie française dans les 15 jours qui ont précédé le début des symptômes

Répartition des cas par âge (cas cumulés et dernier mois 2008)

Classe d'âge	Cas suspects (cumul 2008)	Cas positifs (cumul 2008)	Cas suspects (juillet 2008)	Nouveaux cas positifs (juillet 2008)	Taux pour 100 000 habitants
< 5 ans		8		2	
5-9 ans		20		0	
10-19 ans		27		2	
20-29 ans		13		0	
30-39 ans		28		3	
40-59 ans		33		3	
60 ans et +		9		1	
Total	1022	138	104	11	

Lutte contre les gîtes larvaires

Un gîte larvaire est constitué de tout récipient contenant de l'eau stagnante (même sur 1 cm de profondeur) où les moustiques vont pondre des oeufs.

Les gîtes plus fréquents sont les suivants :

- vieux pneus (très productifs en moustiques)
- objets abandonnés : carcasses de frigo, boîtes vides...



- gouttières bouchées par des feuilles
- puits, boîtes à graisse non étanches (à colmater)


- vases et soucoupes de pots de fleurs
- bâches, bidons...

La lutte contre ces gîtes par la population doit être permanente (au moins une fois par semaine).


Répartition des cas par île

Archipel	Iles	Cas positifs (cumul 2008)	Nouveaux cas (juillet 2008)
Iles du Vent	Tahiti	100	7
	Moorea	7	3
Iles sous le vent	Bora Bora	7	0
	Huahine	0	0
	Maupiti	0	0
	Raiatea	16	0
Marquises	Tahaa	3	0
	Nuku Hiva	0	0
	Ua Pou	0	0
	Hiva Oa	0	0
	Fatu Hiva	0	0
Australes	Tahuata	0	0
	Raivavae	0	0
	Rurutu	0	0
TG	Tubuaiti	0	0
	Fakarava	1	0
	Rangiroa	0	0
Indéterminé	Manihi	0	0
	Hao	0	0
Touristes		4	1
		0	0
Total		138	11



Evolution des cas de dengue par mois (2008)



Répartition des cas hospitalisés par sévérité (2008)



*ISPF - Recensement général de la population de la Pf- 2007



Partenaires du réseau de surveillance de la dengue en Polynésie française:

- Médecins libéraux:
- Centre Hospitalier de Polynésie française : Laboratoire d'analyses médicales, Service des Urgences, Services d'Hospitalisation, Service d'information médicale
- Hôpitaux publics : Moorea, Taravao
- Dispensaires et Centres médicaux :
- Centre de la Mère et de l'Enfant, Centre de Consultation Spécialisé en Hygiène Scolaire, Centre de Protection Infantile
- Institut Louis Malardé
- Services de Santé des Armées
- Cliniques privées Cardella et Paofai

Pour tous renseignements ou si vous souhaitez rejoindre le réseau de surveillance de la dengue:

Direction de la Santé - Bureau des Pathologies Infectieuses

Tel: 48 82 01 - Fax: 48 82 24