

Surveillance sanitaire en Polynésie française

Bulletin du 9 décembre 2011 - Semaine 48-2011

Bulletin disponible sur le site du Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique
http://www.spc.int/phs/PPHSN/Surveillance/Routine_reports.htm



Direction de la santé

Bureau de veille sanitaire

A RETENIR EN SEMAINE 48 (28/11 au 04/12/2011)

Grippe

- Augmentation de l'activité grippale. Trois cas au total ont été confirmés en semaine 48, avec prélèvements rhino-pharyngés positifs en PCR au virus grippal **A/H1N1**.

Dengue

- Activité faible, pas de cas confirmé.

Diarrhées

- Activité en augmentation sur le réseau sentinelle, surtout aux Iles-sous-le-vent (Uturoa, Huahine, Bora). L'activité aux urgences a diminué depuis 2 semaines (pic en semaine 46).

Fièvre

- Activité faible.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Epidémie de gastro-entérites à Salmonella

- Depuis début novembre et jusqu'à ce jour, **25 cas confirmés de gastro-entérites à Salmonella** ont été enregistrés au Bureau de veille sanitaire, dont **19 à Salmonella enteritidis**. Parmi ces cas, **13 ont été hospitalisés**.

- Les investigations épidémiologiques et les prélèvements alimentaires ont permis d'identifier les oeufs comme source commune probable des contaminations. Un premier résultat de prélèvements réalisés dans un élevage de poules pondeuses de Tahiti est positif à **Salmonella enteritidis**. La société d'élevage **SANGUE FARM** a décidé d'arrêter la commercialisation de ses oeufs et a organisé leur retrait. Il s'agit des boîtes d'oeufs avec n° d'agrément **2010-PF**. D'autres prélèvements dans les élevages sont en cours d'analyse.

- Dans ce contexte épidémique, il est fortement conseillé de **ne pas consommer d'oeufs crus ou peu cuits ou des préparations en contenant. Nous demandons à tous les médecins de bien vouloir demander des coprocultures devant tout tableau clinique de gastro-entérite infectieuse.**

Ciguatera

- Une augmentation importante du nombre de cas de ciguatera sur Huahine a été enregistrée depuis le début du mois de novembre. La consommation de *maito* (poisson chirurgical) semble à l'origine de ces intoxications.

Paludisme

- Un cas importé confirmé à *Plasmodium falciparum* a été enregistré en semaine 49. Celui-ci revient d'un séjour en zone 3. La transmission n'est pas possible sur le territoire étant donné l'absence du vecteur (moustique *Anophèle*).

Dengue

- Pensez à proposer un prélèvement aux malades présentant un tableau clinique de dengue, et en particulier s'il s'agit de voyageurs en provenance de zones affectées par la dengue.

ACTUALITES INTERNATIONALES

Dengue dans le Pacifique

- A ce jour, 1104 cas suspects ont été reporté à Majuro (**Iles Marshall**) dont 506 positifs au test rapide (DEN 4). A **Yap**, 685 cas cliniques ont été enregistrés, dont 142 hospitalisations et 2 décès, seul le sérotype DEN-2 circule.

Typhoïde à Fidji

- 16 cas confirmés ont été enregistrés à Nanoko. Les autorités sanitaires imputent cette épidémie au mauvais niveau d'assainissement de la zone et à une eau de boisson impropre à la consommation.




Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé ; Centre de la mère et de l'enfant ; Réseau des médecins sentinelles ; Service de Santé des Armées ; Centre Hospitalier du Taaone ; Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae ; Institut Louis Malardé ; Laboratoires privés ; Cliniques privées Cardella et Paofai ; Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la santé ; Centre d'hygiène et de salubrité publique ; Pharmacies d'officine ; Réseau informatique de santé publique de la Direction de la santé




Equipe du Bureau de veille sanitaire :

Responsable : Dr Henri-Pierre Mallet, Epidémiologiste : Elise Daudens,
Infirmiers : Jean-Paul Pescheux, Secrétaire : Vaea Rougeolles
Tél: 488 201 - fax: 488 212 - mail : veille@sante.gov.pf



Grippe





Dengue





Fièvre isolée



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelle :

Syndrôme grippal :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale,
ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL

Suspicion de dengue :

Fièvre élevée (≥ 38.5) d'apparition brutale datant de moins de 8 jours,
ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies)

ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)

Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles par jour, datant de moins de 14 jours

ET motivant la consultation

Fièvre (autre que dengue et grippe) : Fièvre élevée (> 38) de plus de 3 jours sans cause évidente

Urétrite masculine : Présence d'une dysurie d'apparition récente et/ou d'un écoulement urétral purulent, mucopurulent ou mucoïde récent.

Codage CIM10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences :

Syndrôme grippal : J11
Suspicion de dengue: A90 - A91
Diarrhée: A02 à A09
Fièvre isolée: R509
Urétrite et syndrome urétral : N34

Définition utilisée pour la surveillance de laboratoire:

Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 et/ou RT PCR et/ou IgM